

BOLLETTINO FITOSANITARIO OLIVO (n. 3): 14 agosto 2018

Monitoraggio Mosca dell'Olivo (*Bactrocera oleae*) - Areale VALLE DEL CALORE

Comune	Località	Altitudine (m)	Fase Fenologica	Media catture/trappola/settimana	% infestazione attiva	% infestazione totale	Tendenza	Indicazioni
MIRABELLA ECLANO	C/da San Pietro	337	INGROSSAMENTO FRUTTI	1	5	10	=	Trattamenti con prodotti ad azione antideponente Trattamenti adulticidi
MIRABELLA ECLANO	C/da Bosco Calcare	430	INGROSSAMENTO FRUTTI	1	0	0	=	Trattamenti con prodotti ad azione antideponente
BONITO	C/da Cinquegrana	380	INGROSSAMENTO FRUTTI	1	8	12	=	Trattamenti con prodotti ad azione antideponente Trattamenti adulticidi
BONITO	C/da Cinquegrana	320	INGROSSAMENTO FRUTTI	1	5	15	-	Trattamenti con prodotti ad azione antideponente Trattamenti adulticidi
BONITO	Masiello Tordiglione	410	INGROSSAMENTO FRUTTI	1	1	5	-	Trattamenti con prodotti ad azione antideponente Trattamenti adulticidi
BONITO	Cupa Cusano	403	INGROSSAMENTO FRUTTI	23	2	10	-	Trattamenti con prodotti ad azione antideponente Trattamenti adulticidi
FONTANAROSA	C/da Rotole	567	INGROSSAMENTO FRUTTI	1	2	5	+	Trattamenti con prodotti ad azione antideponente Trattamenti adulticidi
FONTANAROSA	C/da Paradiso	510	INGROSSAMENTO FRUTTI	2	0	0	=	Trattamenti con prodotti ad azione antideponente
SANT'ANGELO ALL'ESCA	C/da Santa Maria	460	INGROSSAMENTO FRUTTI	0	0	0	=	Trattamenti con prodotti ad azione antideponente
SANT'ANGELO ALL'ESCA	Borgo Chiesa	480	INGROSSAMENTO FRUTTI	1	0	1	-	Trattamenti con prodotti ad azione antideponente Trattamenti adulticidi

Fase fenologica: Ingrossamento dei frutti

Monitoraggio:

- Lettura settimanale trappole al fine di monitorare l'andamento della popolazione di adulti;
- Determinazione settimanale della percentuale di infestazione attiva delle drupe (sommatoria di uova e larve) prelevando un campione 100 drupe/ha di oliveto (10 olive scelte a caso dalla chioma di 10 piante rappresentative).

Controllo:

- Trattamenti con prodotti ad azione repellente sulle ovideposizioni: Rame; Caolino; Calce e Rame; Zeolite.
- Trattamenti preventivi (adulticidi) con esche proteiche attivate con Spinosad (ammessi in regime di agricoltura biologica – max 8 trattamenti) o dimetoato (non ammessi in regime di agricoltura biologica) intervenendo alle primissime infestazioni;
- Trattamenti curativi (larvicidi) con dimetoato (non ammessi in regime di agricoltura biologica) al superamento della soglia del 10-15% di infestazione attiva delle drupe.

Note e suggerimenti: Si registrano condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo delle popolazioni del fitofago, sono presenti punture fertili ed elevati livelli di infestazione totale delle drupe. Si consiglia di effettuare le operazioni di monitoraggio e controllo indicate.



**CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA
 REGG. (UE) 611 - 615 / 14 E S. M. I.**